

Министарство просвете Републике Србије
ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

07.03.2009.

VIII РАЗРЕД

ОШ МРЧАЈЕВЦА

1. Решите једначину


$$|x + |2x + |4x|| = 2009.$$

2. Три рационална броја a , b и c су таква да је један већи од нуле, један једнак нули и један мањи од нуле. Ако за те бројеве важи

$$\frac{a(c-b)}{b} > 0,$$

који од тих бројева је већи, који мањи, а који једнак нули?

3. Колико је растојање (види слику) између суседних правих (водоравних односно усправних) ако су пречници свих кругова по 10cm?



4. Докажи да је број $6^{2n+2} - 2^{n+3} \cdot 3^{n+2} + 36$ дељив са 900 за сваки природан број n .
5. Основна ивица правилне шестостране призме повећана је за 200%, а висина је смањена за $p\%$. Ако се запремина те призме повећала за $p\%$, одреди да ли се површина омотача повећала или смањила и за колико процената.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова.

Изrada задатака траје 120 минута.


Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

РЕШЕЊА – VIII РАЗРЕД

1. За $x \geq 0$ имамо $|x + |2x + |4x|| = |x + 6x| = 7x = 2009$, одакле је $x = 287$
(10 бодова). За $x < 0$ имамо $|x + |2x + |4x|| = |x - 2x| = -x = 2009$,
одакле је $x = -2009$ (10 бодова).

2. $b \neq 0$ јер је именилац разломка (3 бода) и $a \neq 0$ јер је производ раз-
личит од 0 (3 бода). Дакле $c = 0$ (4 бода) и $\frac{a \cdot (-b)}{b} > 0$, одакле је
 $-a > 0$, тј. $a < 0$ (8 бодова). Одавде је $b > 0$ (2 бода).

3. Очигледно да је растојање између хоризонталних правих 10cm (5
бодова). Растојање између вертикалних
правих добијамо применом Питагорине те-
ореме на шрафирани троугао са слике чија
је хипотенуза 20cm и једна катета 10cm, па
је тражено растојање $10\sqrt{3}$ cm (15 бодова).



4. (ML XLI-6) Како је

$$6^{2n+2} - 2^{n+3} \cdot 3^{n+2} + 36 = 36 \cdot (6^{2n} - 2^{n+1} \cdot 3^n + 1)$$

$$= 36 \cdot (6^{2n} - 2 \cdot 6^n + 1) = 36 \cdot (6^n - 1)^2 \quad (10 \text{ бодова})$$

и како је $6^n - 1$ дељиво са 5 (5 бодова), следи да је дати број дељив
са 36·25, односно са 900 (5 бодова).

5. (ML XLI-4) Нека је a основица, а H висина призме. Тада је основна
ивица нове призме $3a$, а висина $\left(1 - \frac{p}{100}\right)H$ (3 бода). Како је запре-
мина нове призме већа за $p\%$ у односу на првобитну, добијамо да је

$$6 \frac{(3a)^2 \sqrt{3}}{4} \left(1 - \frac{p}{100}\right)H = \left(1 + \frac{p}{100}\right) 6 \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} H \quad (5 \text{ бодова})$$

Следи да је $9 \left(1 - \frac{p}{100}\right) = 1 + \frac{p}{100}$, па је $p = 80$ (5 бодова). Површина

омотача нове призме је $0,6 \cdot (6 \cdot a \cdot H)$ (4 бода), што значи да се
површина омотача смањила за 40% (3 бода).